




# ОБЪЕДИНЯТЬ ЛУЧШЕЕ — наша традиция

Р N00326/01 от 13.10.2016 г.



- Изокомб® объединяет **4 МНН** основного ряда<sup>1</sup>.
- В состав включен витамин В<sub>6</sub><sup>1</sup>.
- В **3 раза** снижает количество потребляемых таблеток в сутки<sup>2</sup>.
- Разрешен к применению у детей с 13 лет<sup>1</sup>.
- Применение комбинированных препаратов одобрено приказом МЗ РФ N<sup>o</sup>951<sup>3</sup>.
- Российское производство<sup>1,4</sup>.



Информация для медицинских и фармацевтических работников.

Перед назначением препарата ознакомьтесь с инструкцией по применению.

<sup>1</sup> Инструкция по применению лекарственного препарата Изокомб®, утвержденная МЗ РФ

<sup>2</sup> Данные из инструкции к лекарственным препаратам соответствующих МНН, утвержденные МЗ РФ.

<sup>3</sup> Приказ №951 от 29.12.2014 г. «Об утверждении методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания».

<sup>4</sup> Упаковка препарата и выпускающий контроль качества на территории РФ.

 **акрихин**  
Люди заботятся о Людах

# ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ



**Торговое наименование:**  
**ИЗОКОМБ®**

**Регистрационный номер:**

**P N003363/01**

**от 13.10.2016 г.**

**МНН:**

Изониазид +  
пирразинамид +  
рифампицин +  
этамбутол +  
[Пиридоксин]

- Подагра;
- Тромбофлебит.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Внутрь. Взрослым и детям с 13 лет. Препарат дозируется по рифампицину-10 мг/кг массы тела, но не более 5 таблеток. Препарат принимается натощак за 30-40 минут до завтрака. Общая курсовая доза от 2 до 4 месяцев в зависимости от характера туберкулезного процесса. При массе тела 80 кг дополнительно назначается изониазид в вечернее время.

## ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

Подробное описание смотреть в инструкции к препарату.

## ФОРМА ВЫПУСКА:

Таблетки, покрытые оболочкой. Одна таблетка содержит изониазид, 60 мг + рифампицин, 120 мг + пирразинамид, 300 мг + этамбутола гидрохлорид, 225 мг + пиридоксина гидрохлорид, 20 мг. По 50 или 100 таблеток в полимерной банке в картонной пачке вместе с инструкцией.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

## УСЛОВИЯ ОТПУСКА:

По рецепту.

## ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:

Противотуберкулезное комбинированное средство. Код АТХ: J04AM 06.

## ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Впервые диагностированные различные формы и локализации туберкулеза с наличием или отсутствием бактериовыделения (МБТ, чувствительные к основным противотуберкулезным препаратам).

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Гиперчувствительность;
- Беременность, лактация;
- Детский возраст до 13 лет;
- Заболевания печени и желудочно-кишечного тракта в острой фазе;
- Заболевания центральной нервной системы (эпилепсия и другие заболевания со склонностью к судорожным припадкам);
- Заболевания органов зрения (неврит зрительного нерва, катаракта, диабетическая ретинопатия, воспалительные заболевания глаз);