



Препарат
Европейского
качества¹



ВКЛЮЧЕН
В ПЕРЕЧЕНЬ ЖНВЛП

Пульмибуд НАДЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ!



Универсальный иГКС для лечения Бронхиальной астмы⁵, ХОБЛ⁴ и Ложного крупа³



Разрешен к применению у детей с 6 месяцев¹



Препарат Европейского качества¹



Стоимость терапии доступнее на 25%²

¹ Инструкция по применению лекарственного препарата Пульмибуд, утвержденная МЗ РФ.

² Проведен сравнительный анализ цен ПОЦ МНН: будесонид в форме суспензии для ингаляций дозированной по данным ГРПС от 01.07.2019. Сравнили цены препаратов: Пульмикорт и Пульмибуд.

³ Клинические рекомендации. Острый обструктивный ларингит (крупа) и эпиглоттит у детей. - 2016г. С30. Ложный круп - стенозирующий ларинготрахеит.

⁴ Клинические рекомендации. Хроническая обструктивная болезнь легких. -2018г.-С89. ХОБЛ - хроническая болезнь легких. ХОБЛ-хроническая обструктивная болезнь легких.

⁵ Клинические рекомендации. Бронхиальная астма. -2018г.-С.96.

Торговое наименование: Пульмибуд

Регистрационный номер: ЛП-005065

Международное непатентованное наименование: Будесонид

Фармакотерапевтическая группа:

Глюкокортикостероид для местного применения

Код АТХ: R03BA02

Показания к применению:

- Бронхиальная астма, требующая поддерживающей терапии глюкокортикостероидами
- Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)
- Стенозирующий ларинготрахеит (ложный круп)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к будесониду
 Детский возраст до 6 месяцев

Способ применения:

Препарат применяют ингаляционно с помощью небулайзера.

Доза препарата подбирается индивидуально. В том случае, если рекомендуемая доза не превышает 1 мг/сутки, всю дозу препарата можно принять за один раз (единовременно). В случае приема более высокой дозы рекомендуется ее разделить на два приема.

Рекомендуемая начальная доза:

Дети от 6 месяцев и старше: 0,25-0,5 мг в сутки. При необходимости доза может быть увеличена до 1 мг/сутки.

Взрослые/пожилые пациенты: 1-2 мг в сутки.

Доза при поддерживающем лечении:

Дети от 6 месяцев и старше: 0,25-2 мг в сутки.

Взрослые: 0,5-4 мг в сутки. В случае тяжелых обострений доза может быть увеличена.

Таблица для определения дозы

Доза, мг	Объем препарата	
	0,25 мг/мл	0,5 мг/мл
0,25	1 мл*	-
0,5	2 мл	-
0,75	3 мл	-
1	4 мл	2 мл
1,5	-	3 мл
2	-	4 мл

* следует разбавить 0,9% раствором натрия хлорида до объема 2 мл.

Для всех пациентов желательно определить минимальную эффективную поддерживающую дозу.

Стенозирующий ларинготрахеит (ложный круп):

Дети от 6 месяцев и старше: 2 мг в сутки. Дозу препарата можно принять за один раз (единовременно) или разделить ее на два приема по 1 мг с интервалом в 30 мин.

Применение препарата Пульмибуд с помощью небулайзера

Для применения препарата Пульмибуд не подходят ультразвуковые небулайзеры.

Препарат Пульмибуд применяется для ингаляций с использованием соответствующего небулайзера, оснащенного мундштуком и специальной маской. Небулайзер соединяется с компрессором для создания необходимого воздушного потока (5-8 л/мин), объем заполнения небулайзера должен составлять 2- 4 мл. С Техники ингаляции необходимо ознакомиться в инструкции по медицинскому применению препарата.

Побочное действие: имеются побочные действия, ознакомьтесь с Инструкцией по медицинскому применению.

Форма выпуска: Суспензия для ингаляций дозированная 0,25 мг/мл и 0,5 мг/мл.

По 2 мл препарата в ампулу из полиэтилена низкой плотности. 5 ампул спаяны друг с другом в виде блока. Каждый блок помещают в конверт из ламинированной фольги. По 4 конверта с инструкцией по применению в пачке из картона.

Условия хранения: в защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C. Открытая ампула должна быть использован в течение 12 часов. После вскрытия конверта, содержащиеся в нем ампулы должны быть использованы в течение 3 месяцев. Хранить в недоступном для детей месте

Условия отпуска: По рецепту.

***Полная информация по препарату содержится в Инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Пульмибуд**



142450, Московская область, Ногинский район,
 Старая Купавна, улица Кирова, дом 29
 Тел.: +7 (495) 702-95-06
 Факс: +7 (495) 702-95-03
 E-mail: akrikhin@akrikhin.ru



Р.У.ЛП - 005065 от 24.09.2018г

Р.У.ЛП - 005065 от 24.09.2018г